



Nilocin® VORTE PEN

DK



Læs indlægseddelen grundigt inden brug



FÆtsende.



Kun til udvortes brug
Opbevares utilgængeligt for børn

Nilocin® vorte pen benyttes til topikal behandling af vorter på hænder, fødder, krop, arme og ben. Produktet kan benyttes til voksne og børn fra 4 års alderen.



VORTER

Vorter er lokale vækster i huden forårsaget af den humane papillomavirus (HPV). Der eksisterer forskellige typer af vorter. Vorterne optræder alene eller i klumper på hænder, fødder, krop, arme og ben. Vorter er en smitsom sygdom og spredes ved at hud kommer i kontakt med virus.

NILOCIN®

Nilocin® vorte behandling er et CE mærket medicinsk udstyr. Pakningen indeholder en applikator pen samt denne indlægseddelse. Applikator pennen er designet til brug direkte på vorten og indeholder 3 ml. tilstrækkeligt til minimum 220 applikationer.

Ved brug absorberes Nilocin® straks ned i vorten. Pennen indeholder en keratolytisk forbindelse som lokalt nedbrøder og udtørre væv og dermed elimineres vorten. Nilocin® kan benyttes til behandling af børn ned til 4 år.



ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Kun til udvortes brug. Skal opbevares ude af syne og utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel, med en stærk lugt. Inhaler ikke.

- Benyt ikke Nilocin® til behandling af kønvorter samt i ansigtsregionen.
- Undlad at bruge Nilocin®, hvis du er overfølsom overfor indholdsstofferne, samt hvis du er overfølsom overfor bistik og myrebid.
- Undgå kontakt med sund hud rundt om vorten
- Udsæt ikke det behandlede område for sollys, så længe behandlingen pågår.
- Anvend ikke på ømme eller blødende vorter, blærer samt irriteret, betændt eller beskadiget hud. Hold pause med behandlingen indtil huden er restitueret.
- Anvend ikke på vorter med hår, modermærker, pigmenteret hud, eller i tilfælde af at du er i tvivl om hudens tilstand er en vorte.
- Ekstra forsigtighed bør udvises, når behandlingen påføres tynd og følsom hud, og når børn og diabetikere behandles.

• **Det er bedre at påføre for lidt væske end for meget, for at undgå sår, blister, inflammationer, vævsdød, ar og kemiske forbrændinger**

• **Overskrid ikke antallet af anbefalede applikationer**

• Konsulter læge, såfremt det behandlede område bliver rødt og smertefuld eller betændt

• Enkelt patient – flegangsbrug

• Benyt ikke Nilocin® i kombination med andre vorte behandlingsprodukter

• Benyt ikke til børn under 4 år, med mindre ordineret af læge

HVIS PRODUKTET VED ET UHELD KOMMER I ØJNENE, SKYL STRAKS ØJNENE MED RIGELIGE MÆNGDER LUNKENT VAND OG GENTAG I 15 MINUTTER. KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE

SÅDAN BRUGES NILOCIN®

Det anbefales at blødgøre vorten i lunkent vand i minimum 5 minutter inden behandlingen. Såfremt vorten er dækket af hård hud, kan vorten forsigtigt skræbes på overfladen. Den hårde hud fjernes forsigtigt. Fil ikke på vorten. Børn bør behandles af en voksen.

1 Fjern hættten fra Nilocin® pennen.

2 Vorten masseres forsigtigt med tippen af pennen i 20 sekunder. Behandlingen trænger straks ned i vorten. Hele overfalden af vorten skal behandles. Undgå kontakt med den sunde omgivende hud. Hættten påsættes omhyggeligt efter brug.

3 Behandl 3 gange ugentligt i op til 6 uger. Der behandles hver anden dag. Hold efter 2 dages pause – hvorefter denne behandlingscyklus kan genoptages indtil vorten er væk. **Det anbefalede antal applikationer må ikke overskrides.**

Nilocin® pennen leverer en lille mængde farveløs ætsende væske. Er du i tvivl om pennen er tør, presses tippen let mod absorberende papir, og der fremkommer et vådt mærke.

Opstår der ubehag eller smerte stoppes appliceringen. Opstår der en svinden eller brændende fornemmelse eller er behandlingen ved et uheld appliceret på den sunde omgivende hud, skylles med koldt vand.

BIVIRKNINGER

Det er VIGTIGT at produktet anvendes som foreskrevet. Antallet af applikationer må ikke overskrides, idet dette kan medføre hudskader (se også afsnittet **ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER**)

En mild snurren eller brændende fornemmelse kan i visse tilfælde fornemmes i 10-15 minutter efter applicering. Ved overeksponering kan midlertidige bivirkninger opstå, f.eks. en stikkende fornemmelse, rødme, smerte eller blødning. Stop med brug indtil huden er fuldt restitueret.

Der er ingen kendte bivirkninger for gravide og ammende.

Alvorlige hændelser bør indberettes til producenten eller relevant myndighed.

OPBEVARING

Opbevares i den originale emballage, ved 2-25 °C, udenfor direkte sollys, og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdatoen eller 6 måneder efter første brug. Hættten påsættes omhyggeligt efter brug.

Afskaffes i affaldsbøtte til farligt affald.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark
Nilocin® er et af unigroup ApS registreret varemærke

MD REF 101034 **CE** 0481

TEKNISKE DATA - Produkt: Nilocin® pen til behandling af vorter **Indholdsstoffer (INCI):** Formic acid, (85%) Dimethyl isosorbide, Aqua, Caprylic acid, Organum vulgare leaf extract **Indhold:** 3 ml - tilstrækkeligt til minimum 220 applikationer **Registrering:** Medicinsk udstyr, klasse IIa **Opbevaring:** Opbevares ved 2-25 °C i original pakningen, udenfor direkte sollys, og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdatoen eller 6 måneder efter første brug. Hættten påsættes omhyggeligt efter brug **Producent:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby **Yderligere information:** www.nilocin.dk **Kontakt:** info@unigroup.dk

UG25012020-101034-DK



Nilocin® VORTE PEN

DK



Læs indlægseddelen grundigt inden brug



FÆtsende.



Kun til udvortes brug
Opbevares utilgængeligt for børn

Nilocin® vorte pen benyttes til topikal behandling af vorter på hænder, fødder, krop, arme og ben. Produktet kan benyttes til voksne og børn fra 4 års alderen.



VORTER

Vorter er lokale vækster i huden forårsaget af den humane papillomavirus (HPV). Der eksisterer forskellige typer af vorter. Vorterne optræder alene eller i klumper på hænder, fødder, krop, arme og ben. Vorter er en smitsom sygdom og spredes ved at hud kommer i kontakt med virus.

NILOCIN®

Nilocin® vorte behandling er et CE mærket medicinsk udstyr. Pakningen indeholder en applikator pen samt denne indlægseddelse. Applikator pennen er designet til brug direkte på vorten og indeholder 3 ml. tilstrækkeligt til minimum 220 applikationer.

Ved brug absorberes Nilocin® straks ned i vorten. Pennen indeholder en keratolytisk forbindelse som lokalt nedbrøder og udtørre væv og dermed elimineres vorten. Nilocin® kan benyttes til behandling af børn ned til 4 år.



ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Kun til udvortes brug. Skal opbevares ude af syne og utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel, med en stærk lugt. Inhaler ikke.

- Benyt ikke Nilocin® til behandling af kønvorter samt i ansigtsregionen.
- Undlad at bruge Nilocin®, hvis du er overfølsom overfor indholdsstofferne, samt hvis du er overfølsom overfor bistik og myrebid.
- Undgå kontakt med sund hud rundt om vorten
- Udsæt ikke det behandlede område for sollys, så længe behandlingen pågår.
- Anvend ikke på ømme eller blødende vorter, blærer samt irriteret, betændt eller beskadiget hud. Hold pause med behandlingen indtil huden er restitueret.
- Anvend ikke på vorter med hår, modermærker, pigmenteret hud, eller i tilfælde af at du er i tvivl om hudens tilstand er en vorte.
- Ekstra forsigtighed bør udvises, når behandlingen påføres tynd og følsom hud, og når børn og diabetikere behandles.

• **Det er bedre at påføre for lidt væske end for meget, for at undgå sår, blister, inflammationer, vævsdød, ar og kemiske forbrændinger**

• **Overskrid ikke antallet af anbefalede applikationer**

• Konsulter læge, såfremt det behandlede område bliver rødt og smertefuld eller betændt

• Enkelt patient – flegangsbrug

• Benyt ikke Nilocin® i kombination med andre vorte behandlingsprodukter

• Benyt ikke til børn under 4 år, med mindre ordineret af læge

HVIS PRODUKTET VED ET UHELD KOMMER I ØJNENE, SKYL STRAKS ØJNENE MED RIGELIGE MÆNGDER LUNKENT VAND OG GENTAG I 15 MINUTTER. KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE

SÅDAN BRUGES NILOCIN®

Det anbefales at blødgøre vorten i lunkent vand i minimum 5 minutter inden behandlingen. Såfremt vorten er dækket af hård hud, kan vorten forsigtigt skræbes på overfladen. Den hårde hud fjernes forsigtigt. Fil ikke på vorten. Børn bør behandles af en voksen.

1 Fjern hættten fra Nilocin® pennen.

2 Vorten masseres forsigtigt med tippen af pennen i 20 sekunder. Behandlingen trænger straks ned i vorten. Hele overfalden af vorten skal behandles. Undgå kontakt med den sunde omgivende hud. Hættten påsættes omhyggeligt efter brug.

3 Behandl 3 gange ugentligt i op til 6 uger. Der behandles hver anden dag. Hold efter 2 dages pause – hvorefter denne behandlingscyklus kan genoptages indtil vorten er væk. **Det anbefalede antal applikationer må ikke overskrides.**

Nilocin® pennen leverer en lille mængde farveløs ætsende væske. Er du i tvivl om pennen er tør, presses tippen let mod absorberende papir, og der fremkommer et vådt mærke.

Opstår der ubehag eller smerte stoppes appliceringen. Opstår der en svinden eller brændende fornemmelse eller er behandlingen ved et uheld appliceret på den sunde omgivende hud, skylles med koldt vand.

BIVIRKNINGER

Det er VIGTIGT at produktet anvendes som foreskrevet. Antallet af applikationer må ikke overskrides, idet dette kan medføre hudskader (se også afsnittet **ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER**)

En mild snurren eller brændende fornemmelse kan i visse tilfælde fornemmes i 10-15 minutter efter applicering. Ved overeksponering kan midlertidige bivirkninger opstå, f.eks. en stikkende fornemmelse, rødme, smerte eller blødning. Stop med brug indtil huden er fuldt restitueret.

Der er ingen kendte bivirkninger for gravide og ammende.

Alvorlige hændelser bør indberettes til producenten eller relevant myndighed.

OPBEVARING

Opbevares i den originale emballage, ved 2-25 °C, udenfor direkte sollys, og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdatoen eller 6 måneder efter første brug. Hættten påsættes omhyggeligt efter brug.

Afskaffes i affaldsbøtte til farligt affald.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark
Nilocin® er et af unigroup ApS registreret varemærke

MD REF 101034 **CE** 0481

TEKNISKE DATA - Produkt: Nilocin® pen til behandling af vorter **Indholdsstoffer (INCI):** Formic acid, (85%) Dimethyl isosorbide, Aqua, Caprylic acid, Organum vulgare leaf extract **Indhold:** 3 ml - tilstrækkeligt til minimum 220 applikationer **Registrering:** Medicinsk udstyr, klasse IIa **Opbevaring:** Opbevares ved 2-25 °C i original pakningen, udenfor direkte sollys, og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdatoen eller 6 måneder efter første brug. Hættten påsættes omhyggeligt efter brug **Producent:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby **Yderligere information:** www.nilocin.dk **Kontakt:** info@unigroup.dk

UG25012020-101034-DK